



Eukaryotes

Bikonta

Unikonta




Chromalveolata Excavata Rhizaria



Archiplastida


2 жгутика Миозин 2











Amoebozoa




1 жгутик Миозин 1, 2 (могут формировать лобоподии)








Prometazoa и отношение к Eumetazoa




Тип Porifera кл Demospongia отр Dictyoceratida сем Spongiidae род Spongia S. officinalis

Клеточное строение Кремнеземные спикулы Личинка: паренхимула, целобластула, амфибластула Морские и пресноводные Включает 80-90% видов губок Тип Porifera кл Demospongia отр Haplosclerida сем Spongillidae (бадяговые)










геммула

Тип Porifera кл Calcarea Sicon sp.





http://gallery4share.com/


Известковые
Клеточное строение
известковые спикулы
Личинка: целобластула
Морские
Включает около 500 видов

Тип Porifera
кл Hexactinellida
отр Lyssacinosida
сем Euplectellidae
род Euplectella
Е. aspergillum



https://nplus1.ru/news/2015/04/07/sponges

Система Eumetazoa Cnidaria




Тип Cnidaria кл Hydrozoa отр Anthomedusae сем Hydridae род *Hydra*




http://www.mesa.edu.au/cnidaria/cnidaria04.asp




Spiralia



Current Biology






Rotifera (Syndermata)


0,1-1 MM


Эутелия

Ткани синцитиального строения

характерны партеногенез, криптобиоз, цикломорфоз

















Тип Plathyhelminthes Кл Digenea Отр Echinostomatida Сем Fasciolidae Рода *Fasciola F. hepatica*





Печеночная двуустка Fasciola hepatica (из Чендлера). А — строение половой системы; Б — пящаварительная система: 1 — ротовая присоска, 2 — брюшная присоска, 3 — разветвленный кишечник, 4 — совокупительный орган, 5 — яичник, 6 — желточники, 7 — желточные протоки, 8 — семенники, 9 — семяпровод, 10 — матка









мирацидий

Тип Plathyhelminthes кл Cestoda отр Tetraphyllidea сем Taeniidae **Scolex** род *Taenia*



Proglottis



Embryophores

Тип Plathyhelminthes кл Cestoda отр Tetraphyllidea сем Taeniidae род *Taenia*






Зрелый членик



Финна: цистоцерк




цистицеркоз



Lophotrochozoa

Trochozoa

Спиральной дробление Личинка трохофора




Annelida Mollusca Nemertea


Lophophorata


Радиальное дробление Лофофор



Brachiopoda Bryozoa Phoronida










тип Annelida
п/тип Clitellata
кл Olygochaeta
отр Haplotaxida
сем Lumbricidae
род Lumbricus
L. terrestris










Размножение и развитие




особи

Кокон


- 5. Оплодотворение происходит в муфте
- 6. Муфта сползает через голову, образуется кокон, в котором развиваются молодые черви

потом и сперматозоиды, полученные от другой

Тип Annelida н/кл Clitellata кл Hirudinea отр Arhynchobdellida сем Hirudinidae род *Hirudo H. medicinalis*





Gnathobdelliformes челюстные




Руперт, Фокс, Барнс, 2008











Пиявки Hirudinea (Annelida)














Половая система



Тип Mollusca кл Bivalvia п/кл Pteriomorphia отр Mytiloida сем Mytilidae род Mytilus М. edulis










Тип Mollusca кл Bivalvia п/кл Eulamellibranchia отр Unionida сем Unionidae Anodonta cygnea













Иванов, Полянский, Стрелков 1985 Тип Mollusca кл Bivalvia п/кл Protobranchia отр Nuculanoida сем Yoldiidae Yoldia







Nucula tenuis. левая створка раковины и мантин удалены. Вид с левой стороны (ориг.): выросты мантии между зубами замка раковилы, 2 — висцеральная масса, 3 — пе-дальные мускулы, 4 — перед-ний аддуктор, 5 — часть обскладин, 6 - ротовое отверстие, 7 — нога, 8 — подошва ноги, 9 — папиллы ноги, 10 правая мантийная складка, 11 — ротовые допасти, 12 придатки ротовых допастей, 14 — левый ктепидий, 15 задний аддуктор, 16 — гипобранхжальная железа



Тип Mollusca кл Gastropoda п/кл Prosobranchia отр Mesogastropoda сем Ampulariidae род *Pomacea P. bridjesii*








Тип Mollusca кл Gastropoda отр Pulmonata п/отр Eupulmonata









Нейх pomatia. Животное, извлеченное из раколины. Вид со спинной стороны (из Гатчека и Кори):

І — голова, 2 — губкое шупальце, 3 — глажое шушальце, 4 — пога, 5 — край мактин, 6 — кеточные сосуды, 7 — жеточная века, 6 — перекардий с сердцем, 9 — почка, 16 — мочеточких, 11 — вечень, 12 — вершина вкутренностного менка, 13 — колюжеллярный мускул, 14 — белкован желень, 15 — нактия, 16 — шоловое отверстие

. Helix pomatia. Легочная помость вскрыта, мантия отвернута направо. Вид со спинной стороны (из Гатчека и Кори):


Г-голова, 2-губное шупальще, 3-глазное шупальще, 4-нога, 5-храй мантин, 6-край разреза мантин, 7-дно мантийной вости, 8-правераме, 10-предсердие, 11-почка, 12-перажумий мочеточник, 13-мантин, 14-легочная дена, 15-хгоричамий мочеточник, 16-прямая княка, 17-легочные сосуды, 18-паружное отверстие почка, 18-загланое отверстие, 20-дыхагельное отверстие, 21-половое отверстие








Система Eumetazoa Ecdysozoa




1. Ecdysozoa Тип Nematoda кл Chromadorea отр Rhabditida











- Раздельнополость
- Гермафродитизм
- Партеногенез

Чувствительные бурсальные лучи


Спикулы

Кишечник

Отверстие клоаки


• Псевдогамия







http://aquaplantfish.ru/kormlenie/nematoda/nematoda.htm


2. Ecdysozoa
Тип Nematoda
кл Chromadorea
отр Ascaridida
сем Ascaridae
род Ascaris
A. suum









Тип Arthropoda
Класс Crustacea
Подкласс Malacostraca
Отряд Decapoda
Семейство Astacidae
Род Astacus
A. astacus











Тип Arthropoda Класс Hexapoda Подкласс Insecta Отряд Oothecaria п/отр Blattodea





Мальпигиевы сосуды



• Обычные обитатели помещений - пруссак (Blatella germanica) и черный таракан (Blatta orientalis)










Руперт, Фокс, Барнс, 2008


Gregarina (тип Sporozoa)












Паурометаболическое развитие

Cryptocercus питаются древесиной







Род Gromphadorhina









Blaberus cranifer («мертвая голова»)





Жаброноги Anostraca

обособленная голова Туловище - грудь+брюшко непостоянное число грудных сегментов листовидные многофункциональные грудные ножки раздельполые

Реликтовые местообитания, периодически пересых (рыб нет) 15-30 мм, до 10 см

Карапакса нет

А2 у самцов – копуляция


Слож и науплиальные глаза

Питание взвешенными частицами (есть хищники) Эпиподиды – жабры+осморегуляция (от долей % до точки насыщения NaCl)




Огромное количество артемии в прибрежных водах солоноватого озера в Сибири.


http://www.artemia.ru/artemia foto 2.html



%C4%B1m.



Цикломорфоз очень частое явление, связанное с изменениями внешних условий.



http://hydrobiologist.wordpress.com/tag/bosmina-longirostris/

Phyllopoda Листоногие

Notostraca+Caldocera+"Conchstraca" эфемерные пресноводные местообитан Нет пресса хищников Карапакс Филлоподии Нефридии = «раковинные» железы»=максиллярные – баланс жидко Аммоний – через тонкие покровы НС без концентрации Слож+науплиальные глаза



филлоподии передние ножки для подачи еды в рот и передвижения, а задние для дыхания Карапакс Фурка Хищники/ падальщики Есть науплиус 11 пар остий








Их морфология не изменилась в основных чертах со времен <u>Триасового</u> периода, когда появился первый вид современных щитней, *Triops cancriformis*. Это было 220—230 миллионов лет назад, в то время только-только появились <u>динозавры</u>, у растений еще не было <u>цветов</u>, а на Земле был единственный континент <u>Пангея</u>. *Triops cancriformis* считается самым древним видом из существующих ныне.


Isopoda Равноногие, Eumalacostraca








Система Eumetazoa Deuterostomia




Deuterostomia


1. Радиальное дробление



2. Энтероцельная закладка целома




3. На месте бластопора формируется анальное отверстие, дефинитивный рот появляется независимо




Тип Echinodermata Иглокожие Класс Astroidea Морские Отряд Forcipulatida неск мм - неск м Радиальная (пятилучевая) симметрия Семейство Asteriidae Внутренний известковый скелет Род Asterias Мутабельная (изменчивая) соединительная ткань Целомические животные A. rubens Амбулакральная (водно-сосудистая) система Игла Характерна аутотомия 6 классов Железистая клетка Ресничка Десмосома Микропаксиллы Чувствительная клетка ворсинки Кутикула Эктоневральная нервная сеть Эпидермис Дерма Целомический эпителий педицеллярии Гипоневрапьная нервная с Эпилерия Соединительная Челюст Миоэпите-Открывающи пиальные клетки Склероцит Перитонеальная клетка Закрывающая с формирующимся склеритом мылица Бапальный участок Эластичный

анатомия на вскрытии



радиальные нервы + эктоневральная и гипоневральная сети

Амбулакральная (водно-сосудистая) система мадрепоровая генитальный





используемые источники +бесконечные просторы интернета